



INSTITUT NARCÍS XIFRA I MASMITJÀ

Departament de Sanitària CFGM Emergències Sanitàries M5 Atenció sanitària especial UF6- Part imminent	Nom de l'alumne:	
	Data:	Qualificació:

GRAELLA VALORACIÓ PART

PART IMMINENT			
PAS: zona segura	SI	NO	
Es posa guants	SI	NO	
Agafa material correcte			
	Spencer		
	Kit de parts: pinces cordó, pera, bossa placenta, guants estèrils, apòsits estèrils, talla estèril..		
	Oxigen		
	Empapadors (xopadors)		
	Pinces i tisores		
	Bata cel·lulosa		
	Aspirador		
	Monitor		
Es presenten			

A			
pregunta què li passa?	SI	NO	
	SI		
Realitza el test de Malinas per saber si és un part imminent.	SI	NO	
	Quan fa que ha començat		
	Interval entre les contraccions		
	Durada contraccions		
	Paritat		
	Aigües trencades		
Demana color de les aigües	SI	NO	
Demana si té sensació d'empènyer	SI		
Demana cartilla gestació a un familiar	SI	NO	
	Mira temps gestació		
	Mira malalties infeccioses		
	Mira complicacions embaràs		
Tractament empàtic			
Han d'adequar la zona: tancar finestres i portes per evitar corrents i mantenir zona temperada.			

B			
Valora respiració: FR, Sat O2, color pell, esforç respiratori..		NO	
Cal col·locar oxigen?			
Posa dispositiu adequat i concentració adequada			
C			
Col·loca monitor		NO	
Mesura pols	SI		
Mesura TA			
Mira color pell	SI		
pregunta compliment capil·lar (si cal)	SI	NO	
Col·loca via	SI	NO	
ECG , si cal			
D		NO	
Mesura glucèmia (si cal)	SI		
pupil·les (si cal)			
E		NO	
Col·loca la pacient en un lloc còmode per observació	SI		
Col·loca la pacient en posició litotomia	SI	NO	
Col·locar llençol damunt les cames per preservar la intimitat			
realitza en algun moment anamnesi?	SI	NO	
PART			
Col·loca diversos empapadors (xopadors) sota la pelvis mare	SI	NO	
Col·loca la mare semiasseguda (litotomia amb coixins esquena)	SI	NO	
Explica a la mare quan ha d'empènyer	SI	NO	
Netejar i desinfecta zona perineu	SI	NO	

Aguanta perineu amb apòsit per evitar esquinçament i aguanta el cap del nadó per evitar sortida explosiva.



SI

NO

Quan ha sortit el cap mira si porta voltes de cordó umbilical al coll, i si n'hi ha les treu correctament



SI

NO

Espera a que el nadó faci un quart de volta i col·loca les mans correctament



SI

NO

Ajuda a sortir l'espatlla superior aguantant el cap correctament. 	SI	NO	
Ajuda a sortir l'espatlla inferior. 	SI	NO	
Agafa bé el nen quan surt i el posa damunt una talla estèril per eixugar i estimular.	SI	NO	
ATENCIÓ NOUNAT			
Estimula el nadó	SI	NO	
Aspirar vies respiratòries si cal	SI	NO	
Eixuga el nadó sense fregar fort i després canvia la talla i l'embolica bé per evitar la pèrdua de calor.	SI	NO	

Col·locar gorro perquè les fontanel·les són un lloc de pèrdua de calor			
Realitza test APGAR	SI	NO	
	Aparença(color pell)		
	FC (a la base del cordó umbilical)		
	Gesticulació		
	Activitat muscular		
	Respiració (valorar el plor)		
VALOR APGAR			
Pinça el cordó correctament	SI	NO	
Col·loca el nen abrigat sobre la mare	SI	NO	
PLACENTA			
Controla que la mare segueixi amb contraccions per expulsió de la placenta	SI	NO	
Quan surt la placenta comprova que estigui sencera	SI	NO	
Guarda la placenta en una bossa	SI	NO	
TRASLLAT			
Recull apòsits bruts	SI		
Posa compresa a la mare o apòsits entre les cames	SI		
Passa la mare a la camilla de manera correcta	SI		
Trasllat			