

EXAMEN MOSTRA M5 (UF3)

1. **Quins són els símptomes d'una intoxicació per cocaïna?**
 - a. Hipotensió, bradicàrdia, pèrdua de consciència
 - b. Hipertensió, taquicàrdia, hiperactivitat
 - c. Dolor toràcic i mareig
 - d. Vòmits i diarrea

2. **Quina droga és responsable de causar la síndrome de "delirium tremens"?**
 - a. Alcohol
 - b. Heroïna
 - c. Cocaïna
 - d. Marihuana

3. **Quina substància química és un conegut agent asfixiant utilitzat en la guerra química?**
 - a. Clor
 - b. Ammoníac
 - c. Fosgè
 - d. Metà

4. **En el tractament de la intoxicació per monòxid de carboni, quin és el tractament més habitual?**
 - a. Ventilació assistida amb oxigen al 100%
 - b. Administració de methemoglobina
 - c. Hidratació intravenosa
 - d. Inducció del coma medicamentós

5. **L'antídot per a la intoxicació per opiàcis és...**
 - a. Naloxona
 - b. Atropina
 - c. Carbó activat
 - d. Hidroxicobalamina

6. **Els efectes tòxics de la ingestió d'alcohol poden incloure tots EXCEPTE:**
- a. Hipotensió
 - b. Hipertermia
 - c. Disfunció respiratòria
 - d. Hipoglucèmia
7. **La intoxicació per clor es caracteritza per...**
- a. Irritació de les vies respiratòries i mucoses
 - b. Hipotensió greu
 - c. Convulsions i coma
 - d. Danys renals aguts
8. **Quina acció terapèutica és adequada per una picada de medusa?**
- a. Regar amb aigua dolça
 - b. Aplicar vinagre per neutralitzar el verí
 - c. Rentar la zona amb aigua salada i aplicar gel
 - d. Ficar la zona a aigua calenta immediatament
9. **Què cal fer quan una persona presenta signes de botulisme greu després de consumir conserves casolanes?**
- a. Administrar carbó activat immediatament
 - b. Iniciar un tractament amb antitoxines
 - c. Induir el vòmit per eliminar el tòxic
 - d. Aplicar un antídoto tòpic
10. **El cianur és un verí que inhibeix...**
- a. La producció d'adrenalina
 - b. La respiració cel·lular
 - c. L'absorció d'oxigen
 - d. La producció d'insulina