

Examen tipus test de mostra de MP05 UF2

1. La llei del moviment de Newton (1^a llei) afirma que:

- a) Un cos en repòs continuarà en repòs i que un cos en moviment continuarà en moviment a menys que sobre ells actuï una força externa (de la inèrcia)
- b) La energia no es crea ni es destrueix només es transforma
- c) L'energia cinètica depèn de la massa i la velocitat
- d) Els mecanismes bàsics del intercanvi d'energia són relativament senzills

2. Una lesió per una explosió secundària seria:

- a) quan l'ona de l'explosió arriba a la víctima
- b) quan les restes volant poden convertir-se en projectils
- c) quan la mateixa víctima es converteix en projectil
- d) quan les lesions es produeixen per calor i fum

3. Davant un pacient que presenta els següents signes i símptomes: relaxació d'esfínters, hipotensió, bradicàrdia, rigidesa de musculatura de coll i esquena, priapisme, en què hem de pensar?

- a) en lesió cerebral
- b) en lesió abdominal
- c) en lesió medul·lar
- d) en lesió toràcica

4. En què consisteix el xoc neurogènic o medul·lar?

- a) En una augment de la TA, FC normal o lleugera bradicàrdia i pell seca i calent.
- b) En una disminució de la TA, FC normal o lleugera bradicàrdia i pell seca i calent.
- c) En una disminució de la TA, taquicàrdia i pell seca i calent.
- d) En una disminució de la TA, FC normal o lleugera bradicàrdia i diaforesi.

5. Quina d'aquestes corrents té efecte tetànic?

- a) La corrent continua
- b) La corrent alterna
- c) La corrent per fulguració
- d) La corrent per arc voltaic

6. Indica quin criteri és el correcte per la derivació d'un cremat a una unitat de cremats tipus Vall d'Hebron:

- a) Totes les cremades circulars
- b) Les cremades de 2 i 3 grau que afectin a més d'un 15% de la superfície corporal
- c) Totes les cremades elèctriques
- d) Totes són certes

7. Quines de les següents lesions no són produïdes per l'efecte de l'ona expansiva en una explosió?

- a) Trencament del timpà i hematoma epidural
- b) Ruptura intestinal i hemorràgia mesentèrica
- c) Contusions pulmonars i lesions alveolars.
- d) Ferides penetrants i trencament d'extremitats.

8. En el tractament de la SDR d'aixafament és bàsic per prevenir les complicacions:

- a) Una correcta dosi de diürètics
- b) Una correcta hidratació amb líquids abundants abans de l'extracció de l'objecte
- c) Una correcta restricció de líquids per evitar el pas de més substàncies tòxiques als teixits
- d) Cap és certa

9. Cal controlar la temperatura del pacient amb cop de calor periòdicament cada

- a) Mitja hora, fins que no estigui a temperatura corporal adequada
- b) Cada hora, fins que no estigui a temperatura corporal adequada
- c) Cada 10-15 minuts,
- d) En el moment d'iniciar l'atenció i a abans d'arribar al hospital

10. En el tractament d'aquells pacients que han patit **cremades per foc en un incendi** i estan conscients és primordial:

- a) Fixar-se si hi ha hagut inhalació de fum
- b) Fixar-se en la profunditat de les cremades
- c) Fixar-se en l'extensió de les cremades
- d) Fixar-se en l'aspecte de la roba