

EXAMEN TIPUS TEST DE MOSTRA M5 UF1

1. Per comprovar la correcta ubicació del tub endotraqueal utilitzem:
 - a) Pulsioxímetre.
 - b) Capnògraf.
 - c) Fonendoscopi.
 - d) B i c són correctes.

 2. El fet de només monitoritzar un pacient amb els elèctrodes de sota clavícula i abdomen ens permet saber els següents paràmetres:
 - a) Saturació O₂, FC, FR i TA
 - b) A més del anterior pot realitzar ECG
 - c) A més de a i b podem saber la capnografia
 - d) Podem observar la FC, la FR i les ones de Fc, Fr i d' ECG; DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF

 3. Indica la **resposta incorrecte** en relació a la intubació endotraqueal:
 - a) Seguirem fent maniobres de reanimació mentre es col·loca el IOT per evitar interrupcions
 - b) L'auscultació post intubació es realitza en 5 punts del tòrax diferents
 - c) Només aturarem les maniobres de RCP el temps necessari per tal que el tub passi per les cordes bucals
 - d) La intubació està indicada si hi ha una freqüència respiratòria per sota de 10 rpm

 4. Quina agulla agafaries per preparar una medicació per administrar via IM
 - a) la número 1
 - b) la número 2
 - c) la número 3
 - d) la número 4
- 
5. En nens menors de 6 anys el punt de punció de primera elecció en la via intraòssia és:
 - a) Peroné distal.
 - b) Tíbia distal.
 - a) Tíbia proximal.
 - b) Peroné proximal.

 6. Subministrar una medicació en bolus significa:
 - a) Administrar una dosi única d'un medicament durant un període de temps curt
 - b) Administrar un medicament sense diluir o poc diluït
 - c) Administrar un medicament de forma directe a la vena a través del catèter ev
 - d) Totes són certes

7. Quin dels següents medicaments utilitzats en aturades cardiorespiratòries cal diluir en sèrum glucosat:

- a) L'adrenalina
- b) L'amiodarona(trangorex)
- c) Sulfat magnesi
- d) lidocaïna

8. Per carregar la medicació no és cert que :

- a) Cal retirar tot l'aire de la xeringa abans d'administrar-lo al pacient
- b) Cal anotar amb un retolador el contingut de la xeringa
- c) Cal agafar la xeringa el doble de gran del contingut del vial
- d) Cal seguir totes les condicions higièniques

9. La derivada de l'electrocardiograma que dona més informació sobre l'activitat elèctrica del cor i sovint es selecciona a la pantalla del monitor és:

- a) La derivada AVR
- b) La derivada DII
- c) La derivada V1
- d) La derivada DIII

10. L'analgèsic més utilitzat en pacient amb trauma greu és

- a) La Morfina
- b) El acetilsilicilat de lisina
- c) El Fentanil
- d) El metamizol o nolotil