

EXAMEN MOSTRA M5 (UF4)

1. La freqüència cardíaca normal en un adult és de:
 - a. 40–60 bpm.
 - b. 60–100 bpm.
 - c. 100–120 bpm.
 - d. 120–140 bpm.
2. Quin d'aquests fàrmacs és un antiagregant plaquetari?
 - a. Nitroglicerina.
 - b. Àcid acetilsalicílic.
 - c. Metformina.
 - d. Adrenalina
3. L'òrgan afectat en una colecistitis és:
 - a. Fetge.
 - b. Vesícula biliar.
 - c. Pàncrees.
 - d. Ronyó.
4. En una crisi hipertensiva, la pressió arterial sistòlica és:
 - a. >140 mmHg.
 - b. >160 mmHg.
 - c. >180 mmHg.
 - d. >200 mmHg.
5. Un senyor de 62 anys presenta un quadre de dolor toràcic inespecífic i s'ha de traslladar a l'hospital. Presenta una dispnea lleu que no requereix oxigenoteràpia. Viu en una planta baixa a uns 10 metres de la unitat i per obres, el ferm no ofereix facilitats per poder rodar amb la cadira de rodes. Quina és l'opció de mobilització més correcta en aquest cas?
 - a. Aixecar la cadira amb el pacient fins la unitat.
 - b. El pacient pot deambular fins que refereixi increment del dolor o la dispnea.
 - c. El pacient pot deambular marxa enrere amb el vostre ajut.
 - d. Aguantant-lo pot deambular fins a la unitat.
6. En cas d'hipoglucèmia lleu, la millor actuació és:
 - a. Administrar oxigen.
 - b. Donar líquids ensucrats.
 - c. Administrar insulina.
 - d. Fer repòs absolut.
7. L'adrenalina està indicada en:
 - a. Asma lleu.
 - b. Aturada cardiorespiratòria i anafilaxi.
 - c. Hipertensió.
 - d. Diabetis.

8. La cianosi indica:

- a. Hiperventilació.
- b. Hipòxia.
- c. Hipertensió.
- d. Hipertermia.

9. La posició lateral de seguretat està indicada en:

- a. Pacient inconscient amb respiració espontània.
- b. Pacient amb parada cardiorespiratòria.
- c. Pacient conscient i desorientat.
- d. Pacient amb crisi epilèptica activa.

10. L'edema agut de pulmó sol ser conseqüència de:

- a. Insuficiència cardíaca esquerra.
- b. Hipertensió arterial.
- c. Embòlia pulmonar.
- d. EPOC.