

Departament de Sanitària

COMPLECIÓ 2025

CFGM Emergències sanitàries

M6 UF2 I UF3 Mobilització i immobilització

1.- Respon a les següents preguntes tipus test. Recorda que una resposta incorrecta descompte un terç del valor de cada pregunta correcta.

1. En col·locar un pacient a la llitera, com s'ha de situar el tècnic per evitar lesions?
 - a) Amb els peus junts i l'esquena corbada.
 - b) Amb un peu endavant, esquena recta i genolls lleugerament flexionats.
 - c) Amb les cames completament estirades.
 - d) Amb el pes del cos sobre els braços.
2. Quin principi hem de seguir sempre abans de mobilitzar un pacient politraumàtic?
 - a) No moure'l fins a immobilitzar el coll i l'esquena.
 - b) Ajudar-lo a aixecar-se per comprovar la mobilitat.
 - c) Col·locar-lo en decúbit lateral.
 - d) Realitzar un massatge
3. Quina posició adoptem en un pacient amb xoc hipovolèmic?
 - a) Fowler
 - b) Trendelemburg
 - c) Antitrendelemburg
 - d) Decúbit pro
4. Per immobilitzar i traslladar una víctima amb sospita de fractura de fèmur, quin dispositiu és el més indicat?
 - a) Fèrula rígida
 - b) Fèrula pneumàtica de cos sencer
 - c) Fèrula de tracció
 - d) Matalàs de buit
5. En la tècnica del pont holandès, quin és l'objectiu principal?
 - a) Elevar el pacient mantenint l'eix cap-coll-tronc-alineat.
 - b) Girar el pacient per col·locar-lo en decúbit lateral.
 - c) Fer una extracció ràpida del vehicle.
 - d) Traccionar la cama afectada.
6. Quin signe pot indicar una compressió vascular en una extremitat fracturada)
 - a) Escalfor local.
 - b) Absència de pols distal.
 - c) Dolor intermitent.
 - d) Mobilitat conservada.
7. L'embenat recurrent és especialment útil per a:
 - a) Cobrir extremitats després d'una amputació o per embenar zones terminals com dits o cap.
 - b) Immobilitzar grans articulacions com el genoll o colze.
 - c) Aplicar compressió uniforme a una cama.
 - d) Fixar una fèrula de tracció femoral.


8. Quin d'aquests materials NO és d'immobilització?



a)



b)



c)



d)

9. Quina és la finalitat principal d'un embenat Velpeau?

- a) Immobilitzar el colze en posició d'extensió després d'un traumatisme distal.
- b) Immobilitzar l'articulació de l'espatlla i el braç en adducció després d'una luxació o fractura clavicular.
- c) Subjectar un apòsit sobre el tòrax.
- d) Comprimir una ferida a la zona axil·lar.

10. Durant l'assistència a un accident de trànsit, un motorista inconscient porta un casc integral ben ajustat. Presenta respiració irregular, sang a la boca i sospita de fractura cervical. Sou dos tècnics en l'escenari. Quina és l'actuació més adequada i segura?

- a) Obrir la visera, aspirar les secrecions i retirar el casc entre dos rescatadors mantenint l'alineació cervical, per permetre l'obertura de la via aèria i ventilació assistida.
- b) Col·locar immediatament el collarí cervical abans de retirar el casc per evitar moviments del coll.
- c) Tallar la corretja i extreure el casc per la part frontal, sense mobilitzar el cap, per facilitar l'aspiració.
- d) Mantenir el casc posat fins a l'arribada del metge, ja que la seva retirada sempre és perillosa.